



Preparo Retossigmoidoscopia

Para a realização do exame é necessário a realização de lavagem intestinal com fleet enema (PHOSFOENEMA[®]), sendo um (1) frasco 4 horas antes, e outro 2 horas antes do procedimento, esta lavagem intestinal deverá ser realizada na residência.

Não é necessário estar em jejum para a realização deste exame.

Para a realização do fleet enema, siga as orientações do fabricante: antes de usar, retire a capa protetora da cânula retal. Com o frasco para cima, segure com os dedos a tampa sulcada. Com a outra mão, segure a capa protetora, retirando-a suavemente, Inserir suavemente a cânula no reto, como se a ponta fosse em direção ao umbigo. Comprimir o frasco até ser expelido quase todo o líquido. Retire a cânula do reto.

Mantenha-se preferencialmente em decúbito lateral esquerdo (deitado de lado esquerdo) após a aplicação e tente reter máximo tolerável de tempo possível, postergando a evacuação. Jejum não é necessário, mas recomenda-se uma dieta leve pela manhã para evitar ocorrência de náuseas. Você poderá fazer uso de suas medicações rotineiras.

Apresentar-se com :

- Documento de identificação pessoal com foto .
- Carteirinha do convênio médico.
- Guia ou autorização prévia do convênio (quando necessária)
- Trazer exames anteriores